"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Cuidado este producto puede ser dañino si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evite aspirar la neblina de aspersión.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación use guantes, botas, overol de dos piezas, gafas de protección y respirador para ingresar al área tratada.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua para consumo.
- No reenvasar o depositar en contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo Químico: Cimoxanil: Acetamida.**
- **Grupo Químico: Mancozeb: Dithiocarbamato.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrele la copia de esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua durante, mínimo 15 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de ingestión, inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia.
- No introduzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita).
ESSALUD: 0801-1-10200
Para mayor información llamar a ITAGRO S.A. (511) 349-6805

MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al
menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
ITACUR es un fungicida de acción preventiva y curativa por ser sistémico y de contacto. **ITACUR** se aplica a las plantas en aspersión foliar preventivamente o con los primeros síntomas de enfermedad.

Preparación de la mezcla y aplicación:
Disuelva completamente a cantidad de ITACUR en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 ó la mitad, complete el volumen de agua y agile hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

Equipo de aplicación
ITACUR, se puede aplicar con pulverizadora manual o mecánica. Durante las aplicaciones se debe tener cuidado que vaya una buena cobertura sin llegar al punto de goteo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Dependiendo de las condiciones del clima y del ambiente que favorezcan la enfermedad, las aplicaciones pueden iniciarse temprano en el ciclo de cultivo y terminarse en la etapa reproductiva cuando los frutos alcanzan su madurez, fisiológica, similarmente, los periodos entre una aplicación y la siguiente pueden ser menor a 10 días.
No realizar más de 2 aplicaciones, rotando con otros productos de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO
Ingresé al área tratada después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
ITACUR es compatible con los plaguicidas que son compatibles con Mancozeb. Si el producto compañero de la mezcla aumenta el pH del agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al Cimoxanil sufre degradación. En el caso de que se desconozca la compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa a su uso.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil.(200 L)	Kg/ha	(días)	(ppm)
CEBOLLA	Mildiu	*Peronospora destructor*	0.500	1.0	18	CIMOXANIL: 0.5 MANCOZEB: 1.0
PAPA	Hielo (rancha)	*Phytophthora infestans*	0.500	1.5-2.0	14	CIMOXANIL: 0.05 MANCOZEB: 0.2
QUINUA	Mildiu	*Peronospora farinosa*	0.500	-----	25	CIMOXANIL: 0.05 MANCOZEB: ---

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

Escaneado con CamScanner