

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	Chupadera fungosa/ Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	300	90	0.04
PALTO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	150	15	15
VID	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	4	0.05
PÁPRIKA	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	300	3	2

P.C.: Periodo de carencia en días.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC como máximo una (01) aplicación por campaña por año para el cultivo de vid. Para el cultivo de páprika, se recomienda una (01) aplicación por campaña y considerar 02 campañas por año.

Para el cultivo de palto, se recomienda 01 aplicación por campaña, considerando 01 campaña por año en la etapa de brotamiento.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**

